

Veröffentlichungen zu Flora und Vegetation von Südwestdeutsch- land 2000

Zusammengestellt von ANDREAS KLEINSTEUBER
unter Mitarbeit von THOMAS BREUNIG und THOMAS WOLF

- AHRENS WERNER, GERBOTH GERSINE, LABUDDA VOLKER, LUDEMANN THOMAS & SCHOTTMÜLLER EVA 2000: Bannwald „Feldseewald“ im Schwarzwald im Forstbezirk Kirchzarten (vorher Schluchsee). – Ber. Freiburger Forstl. Forsch. 24: 1-130; Freiburg i. Br.
- ANKA KUND-GEORG 2000: Hugo Rauneker. – Jahresh. Ges. Naturk. Württemberg 156: 317-318; Stuttgart.
- ANONYMUS 2000: Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am Bande an Herrn Ulrich Ade. – Jour. Europ. Orch. 32 (3/4): 678-682; Stuttgart.
- BERGMEIER ERWIN & TREIBER REINHOLD 2000: Liste der Taxa, für die in der pflanzensoziologischen Literatur keine Belegaufnahmen aus Baden-Württemberg existieren. – Die Pflanzenpresse 1: 21-27; Karlsruhe.
- BETTINGER ANDREAS & FAUST THOMAS 2000: Die Ackerwildkraut-Gesellschaften des Saarlandes. – Tuexenia 20: 309-333; Göttingen.
- BEYSE RUDOLF 2000: 125 Jahre Exotenwald in Weinheim/Bergstraße - Sein Schöpfer und seine Entwicklung. – Mitt. deutsche dendrolog. Ges. 85: 149-157; Stuttgart.
- BEZIRKSSTELLE FÜR NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE KARLSRUHE (Hrsg.) 2000: Die Naturschutzgebiete im Regierungsbezirk Karlsruhe. - 654 S.; Thorbecke, Stuttgart.
- BOGENRIEDER ARNO & FRISCH ALEXANDER 2000: Gebüsche, Pioniergesellschaften, Trockenrasen und Staudenfluren der „Trockenaue Südlicher Oberrhein“. – In: LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG (Hrsg.): Naturschutz-Spektrum, Themen, Vom Wildstrom zur Trockenaue, 92: 51-116; Regionalkultur, Ubstadt-Weiher.
- BREUNIG THOMAS 2000: Eine weitere Art erobert die Autobahn-Mittelstreifen – auf das Dänische Löffelkraut ist zu achten. – Die Pflanzenpresse 1: 12; Karlsruhe.
- BREUNIG THOMAS 2000: Sandvegetation in der badischen Oberrheinebene. - Ber. Naturwissenschaftl. Ges. Bayreuth XXIV: 315-318; Bayreuth.
- BREUNIG THOMAS & DEMUTH SIEGFRIED 2000: Naturführer Mannheim. Entdeckungen im Quadrat. – 132 S.; Regionalkultur, Ubstadt-Weiher.
- BREUNIG THOMAS & Demuth SIEGFRIED 2000: Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württemberg, 3. neu bearb. Fassung, Stand 15.4.1999. – Naturschutz-Praxis Artenschutz 2: 1-161; Karlsruhe.
- BRIEMLE GOTTFRIED 2000: Ansprache und Förderung von Extensiv-Grünland. Neue Wege zum Prinzip der Honorierung ökologischer Leistungen der Landwirtschaft in Baden-Württemberg. – Natursch. Landschaftsplan. 32 (6): 171-175; Stuttgart.
- BUJNOCH WALTER (Zusammenstellung) 2000: Farnfunde im ehemaligen Regierungsbezirk Trier. 16. Nachtrag. – Dendrocopos 27 (2): 243-244; Trier.
- BUNGENSTAB GEORG 2000: Deutschlands höchster Baum. – Mitt. deutsche dendrolog. Ges. 85: 109-112; Stuttgart. [Deutschlands höchster Baum - eine Douglasie - steht im Stadtwald Eberbach und mißt 59,9m.]
- BUTTLER KARL PETER 2000: Anmerkungen zur Benennung zweier heimischer Klappertopf-Arten. – Hess. Florist. Briefe 49 (3): 45-48; Darmstadt.
- CARBIENER DIDIER 2000: Chroniques naturelles des forêts de Strasbourg. - 256 p.; Éditions du Rhin, Bischheim.
- CASPARI STEFFEN 2000: Neue Moose für Rheinland-Pfalz. – Limprichtia 14: 21-26; Bonn.
- CASPARI STEFFEN, MUES RÜDIGER, SAUER ERHARD, HANS FLORIAN, HESELER ULF, HOLZ INGO, LAUER HERMANN, SCHNEIDER CLAUDIA, SCHNEIDER THOMAS & WOLFF PETER 2000: Liste der Moose des Saarlandes und angrenzender Gebiete mit Bemerkungen zu kritischen Taxa, 2. Fassung. – Abhandl. Delattinia 26: 189-266; Saarbrücken.
- DAHL HANNS-JÖRG, NIEKISCH MANFRED, RIEDL ULRICH & SCHERFOSE VOLKER 2000: Arten-, Biotop- und Landschaftsschutz. – Umweltschutz - Grundlagen und Praxis Band 8: XIV + 424 S.; Economica, Stuttgart.
- DAMBACH KARIN 2000: Ein Versuch zur Quantifizierung der gerodeten Landoberfläche einzelner Landschaften Mitteleuropas mit Hilfe der Pollenanalyse. – 336: XII + 151 S.; J. Cramer in der Geb. Bornträger Verlagsbuchhandlung, Berlin, Stuttgart.
- DE BRUYN UWE, HOHMANN MARIE-LUISE, HOMM THOMAS & RÖLLER OLIVER 2000: Bryologische und lichenologische Untersuchungen im unteren Lautertal (Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen). – Mitt. Pollichia (1999) 86: 69-89; Bad Dürkheim.
- DEHNEN-SCHMUTZ KATHARINA 2000: Nichteinheimische Pflanzen der Flora mittelalterlicher Burgen. – Diss. Bot. 334: 119 S.; J. Cramer in der Geb. Bornträger Verlagsbuchhandlung, Berlin-Stuttgart. [Untersucht wurden u. a. Burgen im Neckartal und auf der Schwäbischen Alb.]

- DERSCH GÜNTHER & MAST RAINER 2000: Verbreitung und Vergesellschaftung von *Calamagrostis phragmitoides* Hartman (Purpur-Reitgras, Poaceae) im Harz. – Tuexenia 20: 119-129; Göttingen. [Vergleich der Vergesellschaftung von *Calamagrostis phragmitoides* im Harz mit der im Schwarzwald und in den Vogesen.]
- DÖRR ERHARD 2000: Verbreitung und Rückgang der Glazialrelikte in den Mooren des Allgäuer Raumes. – Hoppea, Denkschr. Regensburger Botan. Ges. 61: 567-585; Regensburg.
- DOMEDY-KUNZ LIANE & SCHWÄR ULRIKE 2000: Renaturierung eines Teilabschnitts der Aitrach auf der Gemarkung Geisingen/Leipferdingen. – Schr. Ver. Gesch. Naturgesch. Baar 43: 141-152; Donaueschingen. [Mit Artenliste der vorkommenden Pflanzen.]
- DÜLL RUPRECHT 2000: Bemerkenswerte Moosfunde aus dem Rheinland. – Decheniana 153: 81-102; Bonn.
- EISFELD D., HUSS J., OESTEN G., UERPMANN B., VOLZ K.-R. (Hrsg.) 2000: Wald und Schalenwild. Beiträge zu einer Fachtagung an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg am 2. und 3. Dezember 1999. – Ber. Freiburger Forstl. Forsch. 17: 1-177; Freiburg i. Br.
- ELSÄSSER MARTIN 2000: Wirkungen extensiver und intensiver Weidenutzungsformen auf die Entwicklung und Verwertbarkeit von Grünlandaufwüchsen. – Natur Landschaft 75(9/10): 357-363; Stuttgart. [Eine der Untersuchungsflächen liegt bei Aulendorf.]
- ERDNÜSS FRANK & FISCHER EBERHARD 2000: Moosflora und -vegetation naturnaher Erlenwälder im rheinland-pfälzischen Westerwald (BR Deutschland). – Limprichtia 14: 85-119; Bonn.
- FLOR THOMAS 2000: Die floristische Bioindikation und ökologische Bewertung urbaner Flächennutzungen in Heidelberg. – 466 S.; ibidem, Stuttgart.
- FRAHM JAN-PETER 2000: Führer zu bryologischen Exkursionen in der Umgebung von Bonn. 8. Die Teichbodenflora der Teiche in der Westerwälder Seenplatte. – Bryol. Rundbriefe 41: 1-2; Bonn.
- FRAHM JAN-PETER 2000: *Bryum gemmiparum* am Mittelrhein. – Bryol. Rundbriefe 39: 8; Bonn.
- FRAHM JAN-PETER 2000: Führer zu botanischen Exkursionen in der Umgebung Bonns. 6. Xerothermelemente im Mayfeld bei Mayen-Koblenz. – Bryol. Rundbriefe 38: 3-4; Bonn.
- FRAHM JAN-PETER 2000: Massenvorkommen von *Tortula canescens* im Rhein-Moselgebiet. – Bryol. Rundbriefe 36: 3-5; Bonn.
- FRAHM JAN-PETER 2000: Führer zu bryologischen Exkursionen in der Umgebung von Bonn. 5. Wassermoose am Rhein. – Bryol. Rundbriefe 36: 6-8; Bonn.
- FRAHM JAN-PETER 2000: Führer zu bryologischen Exkursionen in der Umgebung von Bonn. 3. Das Ahrtal. – Bryol. Rundbriefe 34: 1-2; Bonn.
- FRAHM JAN-PETER 2000: Tropische Moose in Mitteleuropa. – Bryol. Rundbriefe 34: 3-6; Bonn.
- FRAHM JAN-PETER 2000: Führer zu bryologischen Exkursionen in der Umgebung von Bonn. 2. Die Erpeler Ley. – Bryol. Rundbriefe 33: 4; Bonn.
- FRAHM JAN-PETER, QUANDT DIETMAR & SOLGA ANDREAS 2000: Neufunde von *Targionia hypophylla* an der Mosel. – Bryol. Rundbriefe 33: 5-6; Bonn.
- FRAHM JAN-PETER 2000: *Mannia fragans* von St. Goar ist *Reboulia*. – Bryol. Rundbriefe 33: 8; Bonn.
- FRAHM JAN-PETER 2000: Führer zu bryologischen Exkursionen in der Umgebung von Bonn. 1. Das Siebengebirge. – Bryol. Rundbriefe 32: 5-8; Bonn.
- FRAHM JAN-PETER 2000: *Hilpertia velenovskyi* in Rheinhessen. – Limprichtia 14: 27-30; Bonn.
- FRANKE ALBRECHT 2000: Schwarzpappeln (*Populus nigra* L.) in Baden-Württemberg - Überprüfung der Artreinheit von Reliktorkommen mit Hilfe biochemisch-genetischer Methoden. – Mitt. Ver. forstl. Standortsk. Forstpflanzenzücht. 40: 77-78; Stuttgart.
- FRIEDMANN ARNE 2000: Pollenanalytische Untersuchungen zur holozänen Vegetations- und Landschaftsgeschichte des westlichen Hochschwarzwaldes. – Ber. Naturforsch. Ges. Freiburg 88/89: 57-84; Freiburg i. Br.
- FRISCH ALEXANDER, JEHL PETER & OSTERMANN ALEXANDER 2000: Naturschutz-Projekte an Hoch- und Oberrhein. Hochrhein, Trockenaue Südlicher Oberrhein, Elzwiesen. – In: Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (Hrsg.): Der Rhein. – Der Bürger im Staat. 50 (2): 106-113; Stuttgart.
- FUCHS HANS-JOACHIM & KISTNER ACHIM 2000: Die Wüstung Pferdsfeld im Soonwald nach 20 Jahren: eine landschaftsökologische Bestandsaufnahme, Bewertung, und Konzeption einer sozial-ökologischen Inwertsetzung. – Mitt. Pollichia (1999) 86: 35-68; Bad Dürkheim.
- GARVE ECKHARD & GARVE VERENA 2000: Halophyten an Kalihalden in Deutschland und Frankreich (Elsass). – Tuexenia 20: 375-417; Göttingen. [Es wurden u. a. Kalihalden in Baden-Württemberg und im Elsass untersucht.]
- GMINDER ANDREAS, KRIEGLSTEINER GERMAN J. & WINTERHOFF WULFARD unter Mitarbeit von KAISER ARMIN 2000: Die Großpilze Baden-Württembergs 2: Leisten-, Keulen-, Korallen- und Stoppelpilze, Bauchpilze, Röhrlings- und Täublingsartige. – 620 S.; Stuttgart (Eugen Ulmer).
- GRUND THOMAS & DEHNER RUDI 2000: Orchideen Neufunde aus dem Nordosten Baden-Württem-

- bergs. – Jour. Europ. Orch. 32 (3/4): 623-629; Stuttgart.
- HAND RALF (Zusammenstellung) 2000: Neues aus der Flora der Region Trier (Spermatophyta). Berichtsjahr 1999. – Dendrocopos 27 (2): 236-242; Trier.
- HAUSCHILD RICHARD 2000: Forstliche Standortgliederung der nordelsässischen Rheinebene. – Mitt. Ver. forstl. Standortsk. Forstpflanzenzücht. 40: 7-21; Stuttgart.
- HEIMEIER HELMUT 2000: Zur floristischen Kartierung mittels GPS-Geräten. – Jour. Europ. Orch. 32 (1): 123-134; ohne Erscheinungsort.
- HENKER HEINZ & SCHULZE GERHARD 2000: *Rosa columnifera* – eine neue Rosenart aus der Weinrosen-Gruppe. – Acta Rhodologica II/1999: 13-18; Velburg. [Die bisher als Unterart, Varietät, Form oder Formenkreis bezeichnete Sippe wird von den Autoren als Art neu kombiniert. Sie tritt nach Herbarrevisionen in Süddeutschland „offensichtlich häufiger auf“.]
- HENNECKE MANFRED 2000: Neue *Ophrys apifera*-Fundorte im Rems-Murr-Kreis. – Jour. Europ. Orch. 32 (3/4): 677; Stuttgart.
- HLAWATSCH SILJA, BOGENRIEDER ARNO & SPECK THOMAS 2000: Funktionsanatomie und Biomechanik der Grau-Erle (*Alnus incana*): Vergleich von Pflanzen aus unterschiedlicher Höhenlage im südlichen Schwarzwald. – Ber. Naturforsch. Ges. Freiburg 88/89: 249-276; Freiburg i. Br.
- HOCKENJOS WOLF 2000: Waldpassagen. Gesammelte Versuche über Baum, Wald und Flur. – 180 S.; Dold-Verlag, Vöhrenbach. [Buch u. a. über die verschiedenen Aspekte der Waldnutzung im Schwarzwald.]
- HÖLLGÄRTNER MICHAEL & HIMMLER HEIKO 2000: Hartmann Segge (*Carex hartmannii*) auch in den Queichwiesen. – Pollichia Kurier 16 (3): 14; Annweiler am Trifels.
- HÖLLGÄRTNER MICHAEL 2000: Neues Vorkommen der Bocksriemenzunge (*Himatoglossum hircinum*) in Bad Dürkheim. – Pollichia Kurier 16 (4): 16; Annweiler am Trifels.
- HÖLLGÄRTNER MICHAEL 2000: Wiederfund des Buntenschachtelhalmes (*Equisetum variegatum*) in der Pfalz. – Pollichia Kurier 16 (4): 17; Annweiler am Trifels.
- HÖLLGÄRTNER MICHAEL 2000: Bemerkenswerte Standorte des Rauhzähnigen Schachtelhalmes (*Equisetum x trachyodon*) in der Pfalz. – Pollichia Kurier 16 (4): 18; Annweiler am Trifels.
- HÖLZER ADAM & HÖLZER AMAL 2000: Ein Torfprofil vom Westabfall der Hornisgrinde im Nordschwarzwald mit *Meesia triquetra* Ångstr. – Carolea 58: 139-148; Karlsruhe.
- HOFBAUER RITA, KLEINSTEUBER ANDREAS, LANGE DAGMAR & NEBEL MARTIN 2000: Stuttgart im Wandel. Vorkommen und Bestandsentwicklung von 12 ausgewählten Pflanzen. – 32 S.; Stuttgart.
- HORN KARSTEN & PÄTZOLD FRANK 2000 [1999]: Aktuelle Bestandssituation und Gefährdung des Stachelsporigen Brachsenkrautes (*Isoetes echinospora* Durieu) in Baden-Württemberg. – Carolea 57: 43-56; Karlsruhe.
- HUNGER HOLGER & HAFNER STEFAN 2000 [1999]: Zwei Neufunde des Alpen-Leinblatts (*Thesium alpinum*) in der Markgräfler Rheinebene. – Carolea 57: 121-125; Karlsruhe.
- HUSSENDÖRFER ERWIN & KONNERT MONIKA 2000: Untersuchungen zur genetischen Variation der Weißtanne (*Abies alba* Mill.) in Plenterwäldern im Vergleich zu Altersklassenwäldern. – Forstwissenschaftl. Centralblatt 119: 208-225; Berlin. [Die genetischen Daten stammen von 18 Weißtannenbeständen aus der Schweiz, 6 aus Baden-Württemberg und 2 aus Bayern.]
- JEDICKE ECKHARD 2000: Biodiversitäts-Indikatoren zur Bewertung von Nachhaltigkeit in Baden-Württemberg. Studie im Rahmen des Projektes „Statusbericht Nachhaltige Entwicklung in Baden-Württemberg“. Arbeitsbericht. – Arbeitsber. TA-Akad. 162: 1-82; Stuttgart.
- JÉRÔME CLAUDE 2000: Nouvelles observations sur la présence d'*Asplenium obovatum* Viv. subsp. *lancaolatum* (Fiori) Pinto da Silva dans les Vosges gréseuses. – Bauhinia 14: 89-91; Basel.
- JOHN VOLKER 2000: Das Herbarium von Alfred Blaufuß in den Sammlungen der POLLICHIA (POLL.). – Mitt. Pollichia 86 (1999): 91-98; Bad Dürkheim "1999".
- KALTEISEN MANFRED 2000: Kartierungsexkursion im nördlichen Oberschwaben. – Jour. Europ. Orch. 32 (3/4): 690-692; Stuttgart.
- KIFFE KARL 2000: Die *Carex rostrata*-Hybriden der „Standardliste der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands“: II. Herbar- und Literatúrauswertung und einem Nachtrag zu den aktuellen Vorkommen in Deutschland. – Gleditschia 28 (1-2): 7-16; Berlin. [Hinweise zu Literaturangaben und Herbarberlegen von *Carex rostrata*-Hybriden aus Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg.]
- KILLMANN DOROTHEE & FISCHER EBERHARD 2000: Bemerkenswerte Flechten- und Moosfunde aus Westerwald und Lahntal. – Hess Florist. Briefe 49 (3): 37-45; Darmstadt.
- KLAUCK EBERHARD-JOHANNES 2000: Die Gänse-distel-Gauchheil-Gesellschaft. – Tuexenia 20: 283-287; Göttingen. [Die Vegetationsaufnahmen stammen u. a. aus dem Saarland und Rheinland-Pfalz.]
- KLÖPFER HELMUT 2000: Die Entwicklung von Frauenschuh-Standorten. – Faunist. Florist. Mitt. Taubergrund 18: 15-22; Bad Mergentheim.

- KOPERSKI MONIKA, SAUER MICHAEL, BRAUN WALTHER & GRADSTEIN S. ROB 2000: Referenzliste der Moose Deutschlands. – Schriftenreihe Vegetationsk. 34: 1-519; Bonn-Bad Godesberg.
- KRAFT MICHAEL, SCHREINER MARTIN, REIF ALBERT & ALDINGER EBERHARD 2000: Veränderungen von Bodenvegetation und Humusaufgabe im Nord-schwarzwald. – Allg. Forstzeitschr. / Der Wald 55(5): 222-224; München.
- KRIEGLSTEINER GERMAN J. unter Mitarbeit von KAISER ARMIN 2000: Die Großpilze Baden-Württembergs 1: Allgemeiner Teil; Ständerpilze: Gallert-, Rinden-, Stachel- und Porenpilze. – 629 S.; Eugen Ulmer, Stuttgart.
- KUBITZ BEATE 2000: Die holozäne Vegetations- und Siedlungsgeschichte in der Westeifel am Beispiel eines hochauflösenden Pollendiagramms aus dem Meerfelder Maar. – Diss. Bot. 339: 106 S.; J. Cramer in der Geb. Bornträger Verlagsbuchhandlung, Berlin, Stuttgart.
- KUCERA JAN 2000: Illustrierter Bestimmungsschlüssel zu den mitteleuropäischen Arten der Gattung *Didymodon*. – Meylania 19: 2-49; Birmensdorf.
- LÄPPLE HELMUT 2000: Orchideen im Landkreis Rastatt und im Stadtkreis Baden-Baden. Addenda 1995-1999. – Jour. europ. Orch. 32 (2): 223-278; Stuttgart.
- LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG (Hrsg.) 2000: Verzeichnis der Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete des Landes Baden-Württemberg (Stand 31.12.1999), 4. neu bearb. Auflage. – Natursch. Praxis Flächenschutz 3: 28 S.; Karlsruhe.
- LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG (Hrsg.) 2000: Vom Wildstrom zur Trockenaue. Natur und Geschichte der Flusslandschaft am südlichen Oberrhein. – Naturschutz-Spectrum, Themen 92: 496 S.; Regionalkultur, Ubstadt-Weiher
- LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG (Hrsg.) 2000: Naturschutzgebiet Teck. – Naturschutz-Spectrum. Gebiete 24: 120 S.; Regionalkultur, Ubstadt-Weiher.
- LANG WALTER & WOLFF PETER 2000: Achte Nachträge zur „Flora der Pfalz“ – Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen für die Pfalz und ihre Randgebiete. – Mitt. Pollichia (1999) 86: 111-126; Bad Dürkheim.
- LANG WALTER 2000: Kurzbericht über die Exkursion der Kommission „Flora der Pfalz“. – Pfälzer Heimat 51 (4): 165-166; Speyer.
- LAUER HERMANN 2000: Der Stand der Moosforschung in der Pfalz. – Pollichia Kurier 16 (2): 22; Annweiler am Trifels.
- LIPPERT WOLFGANG 2000: Auch gewöhnliche Pflanzen bieten Neues. Zum Vorkommen von „*Urtica galeopsifolia*“ in Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz. – Hoppea, Denkschr. Regensburger Botan. Ges. 61: 615-622; Regensburg.
- LUDWIG WOLFGANG 2000: *Veronica dillenii* ehemals (?) in Hessen, mit Anhang: über den Floristen Hermann Bagge (1815-1899). – Hess. Florist. Briefe 49 (3): 48-55; Darmstadt.
- LÜTH MICHAEL & WOLF WALTER 2000: Neufund von *Euonymus latifolius* (L.) Mill. und *Rosa abietina* Gren. im Schwarzwald. – Mitt. bad. Landesver. Naturk. Natursch. N.F. 17(3): 669-674; Freiburg i. Br.
- LÜTH MICHAEL 2000: *Rosa abietina* und andere Funde von Wildrosen aus Südbaden. Mit einem Bestimmungsschema für die Sectio *Caninae*. – Acta Rhodologica II/1999: 65-73; Velburg.
- LÜTH MICHAEL 2000: Revision des Moosherbars Dr. Winter: Grimmiaceae. – Mitt. bad. Landesver. Naturk. Natursch. N.F. 17(3): 651-662; Freiburg i. Br.
- MANZKE WERNER & WENTZEL MARTIN 2000: Das Laubmoos *Cryphaea heteromalla* (Hedw.) Mohr auch im Sandstein-Odenwald (Hessen, Bayern). – Hess. Florist. Briefe 49 (4) 70-76; Darmstadt.
- MATTERN HANS & KLOTZ ERICH 2000: Bodensaure Heiden auf der nordöstlichen Schwäbischen Alb. Verbreitung, Gefährdung, Pflege. – Jahresh. Ges. Naturk. Württemberg 156: 93-125; Stuttgart.
- MATZKE-HAJEK GÜNTER 2000: Einige neue Erkenntnisse zur Taxonomie und Nomenklatur westdeutscher Brombeeren (*Rubus* L., Rosaceae). – Decheniana 153: 51-57; Bonn. [Der Artikel enthält u.a. den aktuellen Kenntnisstand über die bisher nur im Hunsrück (Rheinland-Pfalz) nachgewiesene *Rubus insericatus*.]
- MAZOMEIT JOHANNES 2000: Bürgert sich *Abutilon theoprasti* Med. im Oberrheingebiet ein? – Florist. Rundbriefe 34 (1): 49-60; Göttingen.
- METZLER B. & ERFA RUDOLF VON 2000: Zur Verbreitung von Buchenkrebs in Naturverjüngungen in Baden-Württemberg. – Forstwissenschaftl. Centralblatt 119: 297-309; Berlin.
- MICHIELS HANS-GERHARD 2000: Der natürliche Wald – ein Leitbild für den naturnahen Waldbau in der Oberrheinaue? – Mitt. Ver. forstl. Standortsk. Forstpflanzenzücht. 40: 23-34; Stuttgart.
- MINISTERIUM FÜR LÄNDLICHEN RAUM BADEN-WÜRTTEMBERG in Zusammenarbeit mit der LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG (Hrsg.) 2000: Natura 2000 in Baden-Württemberg. – CD-ROM, Karlsruhe.
- MINISTERIUM LÄNDLICHER RAUM BADEN-WÜRTTEMBERG in Zusammenarbeit mit der LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG (Hrsg.) 2000: Natura 2000 in Baden-Württemberg. Lebensräume und Arten von A bis Z im Europäischen Verbund. – 162 S.; Stuttgart.

- MINISTERIUM LÄNDLICHER RAUM BADEN-WÜRTTEMBERG (Hrsg.) 2000: Natur entdecken. Streifzüge durch reizvolle Naturschutzgebiete Baden-Württembergs. – 98 S.; Stuttgart.
- MOOSMAYER HANS-ULRICH & KUBLIN EDGAR 2000: Beziehungen zwischen Zuwachs der Fichte und Standort, Witterung, Kronenzustand auf Standortseinheiten der Ostalb. – Mitt. Ver. forstl. Standortsk. Forstpflanzenzücht. 40: 63-71; Stuttgart.
- MÜCKSCHEL CLAUS & DIERICHS MONIKA 2000: Zum Vorkommen von bemerkenswerten sowie seltenen und gefährdeten Pflanzenarten im Kreis Neuwied (Rheinland-Pfalz). – Fauna Flora Rheinland-Pfalz 9 (2): 425-446; Landau.
- MÜCKSCHEL CLAUS 2000: Floristische Beobachtungen in aufgelassenen Steinbrüchen des Rheinischen Westerwaldes. – Decheniana 153: 59-67; Bonn.
- NAWRATH STEFAN & BUTTLER KARL PETER 2000: *Rhinanthus glacialis* in Hessen. Mit Hinweisen auf brauchbare Bestimmungsmerkmale der in Hessen heimischen *Rhinanthus*-Arten. – Bot. Natursch. Hessen 12: 97-111, Frankfurt am Main. [Kommentar zu ehemaligen Vorkommen bei Wiesloch]
- NEBEL MARTIN & PHILIPPI GEORG (Hrsg.) 2000: Die Moose Baden-Württembergs 1: Allgemeiner Teil; Spezieller Teil (Bryophytina I, Andreaeales bis Funariales). – 512 S.; Eugen Ulmer, Stuttgart.
- NICKEL ELSA & WEBER JOACHIM 2000 [1999]: 1998: 7 neue Naturschutzgebiete im Regierungsbezirk Karlsruhe. – Carolinea 57: 135-147; Karlsruhe.
- NICKEL ELSA 2000: Naturkundemuseen und Naturschutz - gemeinsam für Biodiversität. – Carolinea 58: 265-267; Karlsruhe.
- NICKEL ELSA & WEBER JOACHIM 2000: 1999: 3 neue Naturschutzgebiete im Regierungsbezirk Karlsruhe. – Carolinea 58: 269-278; Karlsruhe.
- NOBIS WOLFGANG 2000: Annuelle Ruderalvegetation und Sukzession auf Binnendünen am Oberrhein. – Ber. Naturwissenschaftl. Ges. Bayreuth XXIV: 319-321; Bayreuth.
- OBERMANN HANS-WERNER 2000: Die Trockenmauer – der verborgene Biotop. Besiedlung des Ökosystems durch ausgewählte Tiergruppen, dargestellt am Beispiel zweier Weinbergsanlagen an der Mosel. – Pollichia Buch 39: 171 S.; Bad Dürkheim.
- OCHSMANN JÖRG 2000: Morphologische und molekularsystematische Untersuchungen an der *Centaurea stoebe* L.-Gruppe (Asteraceae-Cardueae) in Europa. – Diss. Bot. 324: IX + 242 S.; J. Cramer in der Geb. Borntäger Verlagsbuchhandlung, Berlin-Stuttgart. [Angaben von *Centaurea diffusa*, *Centaurea stoebe* und *Centaurea x psammogena* (*C. diffusa* x *C. stoebe*) aus Süddeutschland.]
- OESAU ALBERT 2000: *Phascum floerkeanum* F. Weber & D. Mohr, ein wiederentdecktes Laubmoos auf Stoppeläckern und stillgelegten Ackerflächen in Rheinhessen (Rheinland-Pfalz). – Fauna Flora Rheinland-Pfalz 9 (2): 447-464; Landau.
- OESAU ALBERT 2000: Zur epiphytischen Moosflora einer Erwerbsobstanlage bei Mainz. – Fauna Flora Rheinland-Pfalz 9 (2): 465-476; Landau.
- OESAU ALBERT 2000: Zur Moosflora des Rabenkopfes bei Heidesheim in Rheinhessen (Rheinland-Pfalz). – Mainzer Naturwissenschaftl. Archiv 38: 93-109; Mainz.
- PEINTINGER MARKUS 2000: Langfristige Veränderungen der Blühhäufigkeit seltener Geophyten in Pfeifengraswiesen: zeitlicher Trend oder Einfluss von Wasserstand und Wetter? – Bauhinia 14: 33-44; Basel. [Die Populationen der untersuchten Pflanzen liegen im Naturschutzgebiet „Wollmatinger Ried-Untersee-Gnadensee“.]
- PFÜNDEL THOMAS, WALTER EVA & MÜLLER THEO 2000: Die Pflanzenwelt der Schwäbischen Alb, 2. verb. Auflage. – 239 S.; Verlag des Schwäbischen Albvereins, Stuttgart.
- PHILIPPI GEORG 2000 [1999]: Dr. Herbert Schindler † 1907-1998. – Carolinea 57: 149-151; Karlsruhe.
- PHILIPPI GEORG 2000: Flora und Vegetation. – In: BEZIRKSSTELLE NATURSCH. LANDSCHAFTSPFL. KARLSRUHE (Hrsg.): Die Naturschutzgebiete im Regierungsbezirk Karlsruhe: 65-80; Jan Thorbecke, Stuttgart.
- PHILIPPI GEORG 2000: Vegetationskartierung in Baden-Württemberg. – Carolinea 58: 125-138; Karlsruhe.
- PISOKE THOMAS 2000: Die Waldstruktur im Bannwald Taubergießen. Eine Luftbilddauswertung im strukturreichen Auewald. – Ber. Freiburger Forstl. Forsch. 22: 96 S.; Freiburg i. Br.
- PLIENINGER WALTER 2000: Beiträge zur Kenntnis kultivierter *Salix*-Arten in Baden-Württemberg (II). – Jahresh. Ges. Naturk. Württemberg 156: 127-132; Stuttgart.
- PLIENINGER WALTER & MILBRADT JOACHIM 2000: Exkursion des Arbeitskreises „Heimische Wildrosen“ im Neckarland vom 6.8-8.8.1999. – Acta Rhodologica II/1999: 91-102; Velburg. [Es wurden außer den *Rosa*-Arten auch weitere bemerkenswerte Pflanzenfunde notiert.]
- RAAMSDONK L.W.D. VAN 2000: Der *Ornithogalum umbellatum-angustifolium*-Komplex in Deutschland. – Florist. Rundbriefe 33 (2) (1999): 104-113; Göttingen. [Hinweise zu *Ornithogalum pyrenaicum* und *Ornithogalum cf. kochii* in Baden-Württemberg.]
- RASBACH HELGA, RASBACH KURT, JÉRÔME CLAUDE & SCHROPP GABRIEL 2000 [1999]: Die Verbreitung von *Trichomanes speciosum* Willd. (Pteridophy-

- ta) in Südwestdeutschland und in den Vogesen. – *Carolinea* 57: 27-42; Karlsruhe.
- RAU H. & BRANDL H. 2000: Zwei Jahrhunderte Forstgeschichte Baden-Württemberg. Von der Königlich-Württembergischen Forstdirektion zur Forstdirektion Stuttgart. – Ber. Freiburger Forstl. Forsch. 19: 191 S.; Freiburg i. Br.
- REICHELT GÜNTHER 2000: Arche Noah in der Riedbaar – Zur Entwicklung einiger angelegter Biotope 1978-1998. – Schr. Ver. Gesch. Naturgesch. Baar 43: 162-179; Donaueschingen. [Mit Vegetationskarte und Pflanzenlisten, die die Veränderung der Teichbodenvegetation dokumentieren.]
- REICHERT HANS 2000: Ein bedeutender Sohn der Stadt Kusel: der Botaniker Wilhelm Daniel Joseph Koch (1771-1849). Zum 150. Todestag am 14. November 1999. – *Pfälzer Heimat* 51 (2): 46-49; Speyer.
- REICHERT HANS 2000: Ergänzende Beobachtungen zur Phänologie von Wildrosen. – *Acta Rhodologica* II/1999: 31-44; Velburg. [20 Sträucher wurden an einem Weinbergshang bei Trier untersucht.]
- REICHELLE PETRA, BRUCH INGO & SIEGL ANKEA 2000: Aquatische Gefäßpflanzen und chemische Wasserbeschaffenheit im Einzugsgebiet der Lenik (Mosel-Saar-Gebiet). – *Abhandl. Delattinia* 26: 167-188; Saarbrücken.
- REIF ALBERT 2000: Vegetation der Hecken des Münstertals, Südschwarzwald. – Ber. Naturforsch. Ges. Freiburg 88/89: 119-146; Freiburg i. Br.
- REIF ALBERT & NICKEL ELSA 2000: Pflanzung von Gehölzen und „Begrünung“. Ausgleich oder Eingriffe in Natur und Landschaft? – *Natursch. Landschaftsplan*. 32 (10): 299-308; Stuttgart.
- REIF ALBERT, ZIMMERMANN REINHARD & SPÄTH VOLKER 2000: Vegetation der Auenwälder am südlichen Oberrhein. – In: LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG (Hrsg.): *Naturschutz-Spectrum, Themen, Vom Wildstrom zur Trockenaue*, 92: 117-152; Regionalkultur, Ubstadt-Weiher.
- RIEBOLD ALBERT 2000: Die Pflanzenwelt der Gemeinde Oedheim. Eine botanische Bestandsaufnahme. – *Jahresh. Ges. Naturk. Württemberg* 156: 133-149; Stuttgart.
- RÖLLER OLIVER 2000: *Sphaerocarpos michelii* Bell. und *Sphaerocarpos texanus* Aust. in der Pfalz. – *Pollichia Kurier* 16 (3): 7-8; Annweiler am Trifels.
- RÖLLER OLIVER 2000: Erstnachweis von Beyrichs Sternlebermoos (*Riccia beyrichiana* Hampe ex. Lehm.) in Rheinland-Pfalz. – *Pollichia Kurier* 16 (4): 14-15; Annweiler am Trifels.
- RUTHSATZ BARBARA 2000: Vergleich der Qualität von Quellwässern aus bewaldeten und agrarisch genutzten Einzugsgebieten im westlichen Hunsrück und ihr Einfluß auf die Vegetation der durchsickerten Feuchtfelder. Comparison of the Chemistry of Spring Waters from Forest and Farmland Areas in the Western Hunsrück (Rhineland-Palatinate) and its Influence on the Vegetation of Wetlands. – *Arch. Natursch. Landschaftsforsch.* 39: 167-189; Yverdon.
- SAYER UWE 2000: Die Ökologie der Flaumeiche (*Quercus pubescens* Willd.) und ihre Hybriden auf Kalkstandorten. Untersuchungen zu Boden, Klima und Vegetation. – Diss. Bot. 340: 198 S.; [Die Untersuchungsgebiete liegen im Klettgau und auf der Schwäbischen Alb.]
- SCHILLER LIESELOTTE 2000: Das Vegetationsmosaik von biologisch und konventionell bewirtschafteten Acker- und Grünlandflächen in verschiedenen Naturräumen. – Diss. Bot. 337: 183 S.; J. Cramer in der Geb. Bornträger Verlagsbuchhandlung, Berlin, Stuttgart.
- SCHMID MARTIN 2000: *Viola suavis*, eine neue Veilchenart für die Flora Baden-Württembergs. – *Jahresh. Ges. Naturk. Württemberg* 156: 151-155; Stuttgart.
- SCHOLZ PETER 2000: Katalog der Flechten und flechtenbewohnenden Pilze Deutschlands. – *Schriftenreihe Vegetationsk.* Heft 31: 1-298; Bonn-Bad Godesberg.
- SCHRAMM CARMEN & RENNENBERG HEINZ 2000: Sensitivität von Ökotypen der Buche (*Fagus sylvatica* L.) gegenüber Trockenstress. – *Forstwissenschaft. Centralblatt* 119: 51-61; Berlin. [Das Untersuchungsmaterial stammt aus verschiedenen Regionen Baden-Württembergs.]
- SCHULTE WOLFGANG & VOGGENREITER VOLKER 2000: Florenkartierung als Beitrag für den Naturschutz im Siedlungsbereich. – *Schriftenreihe Vegetationsk.* Heft 33: 1-319; Bonn-Bad Godesberg. [Enthält Hinweise auf floristische Rasterkartierungen im Saarland (Schmelz, Saarlois) und in Baden-Württemberg (Karlsruhe).]
- SMETTAN HANS W. 2000: Der Kugelhofer Moor- topf in Hohenlohe – Naturwissenschaftliche Untersuchungen zu seiner Entwicklung und zur Besiedlungsgeschichte in seiner Umgebung. – *Jahresh. Ges. Naturk. Württemberg* 156: 157-187; Stuttgart.
- SMETTAN HANS W. 2000: Vegetationsgeschichtliche Untersuchungen am oberen Neckar im Zusammenhang mit der vor- und frühgeschichtlichen Bedeutung. – *Materialh. Archäol. Baden-Württemberg* 49: 149 S.; Konrad Theiss, Stuttgart. [In der Zusammenstellung 2000 (Kleinsteuber, A. 2001, Ber. Bot. Arbeitsgem. Südwestdeutschland 1: 61) versehentlich mit Erscheinungsdatum 1999 angegeben.]
- SPÄTH VOLKER & REIF ALBERT 2000: Auenwälder am Oberrhein. Ihre Geschichte, ihre Nutzung, ihre Zukunft. – In: Landeszentrale für politische

- Bildung Baden-Württemberg (Hrsg.): Der Rhein. – Der Bürger im Staat 50 (2): 99-105; Stuttgart.
- STIFTUNG NATURSCHUTZGESCHICHTE (Hrsg.) 2000: Wegmarken. Beiträge zur Geschichte des Naturschutzes. Festschrift für Wolfgang Pflug. – Veröffentl. Stift. Naturschutzgeschichte 1: 284 S.; Klartext, Essen.
- TÄUBER THOMAS 2000: Phänologische Daten als Hilfsmittel zur syntaxonomischen Differenzierung von Pionierbeständen – dargestellt am Beispiel von Zwergbinsen-Gesellschaften. – Tuexenia 20: 365-374; Göttingen.
- TIMMERMANN GEORG 2000: Der Wildrosengarten „Äuble“ in Rottenburg am Neckar, Bestandsliste und Pflanzplan, Stand 1.11.1999. – Acta Rhodologica II/1999: 5-11; Velburg.
- TREIBER REINHOLD 2000: Pflanzengesellschaften und Nutzungsgeschichte eines Streuwiesen-Niedermoor-Komplexes im Drumlinfeld des Rhein-Bodensee-Gletschers (Bayern) und ein syntaxonomischer Vergleich mit bodensauren Pfeifengras-Wiesen des Westallgäuer-Hügellandes (Baden-Württemberg). – Ber. Naturforsch. Ges. Freiburg 88/89: 147-184; Freiburg i. Br.
- TREIBER REINHOLD & REINEKE DIETER 2000: Kurze Mitteilungen: Großes Vorkommen der Echten Mondraute (*Botrychium lunaria*) am Hohenstوفeln. – Mitt. bad. Landesver. Naturk. Natursch. N.F. 17(3): 663-665; Freiburg i. Br.
- UHL DIETER & MOSBRUGGER VOLKER 2000: Variabilität der Aderungsdichte in Laubblättern von Fels-Ahorn (*Acer monspessulanum* L.). – Mitt. Pollichia (1999) 86: 99-109; Bad Dürkheim.
- UHL DIETER 2000: Pflanzenfunde aus dem Oligozän des Nahe-Gebietes. – Pollichia Kurier 16 (3): 13; Annweiler am Trifels. [Die Ergebnisse der Untersuchung wurde an Blättern aus dem Pollichia-Herbar und an Blättern aus dem Nahe-Gebiet gewonnen.]
- ULLRICH THOMAS 2000: Der Bannwald „Eiberg“ im Forstbezirk Bad Wildbad (Baden-Württemberg), Forstliches Wuchsgebiet Schwarzwald. Ergebnisse der Forstlichen Grundaufnahme 1998. – Ber. Freiburger Forstl. Forsch. 18: 48; Freiburg i. Br.
- VÖLKER CAROLIN, SCHMIEDER KLAUS & BÖCKER REINHARD 2000: Vegetationsentwicklung eines renaturierten Uferabschnittes am Bodensee - Obersee innerhalb von 10 Jahren. – Ber. Inst. Landschaft Pflanzenökol. Univ. Hohenheim 9: 23-28; Stuttgart (Hohenheim).
- VÖTH WALTER 2000: Die Verwandtschaft zwischen *Limodorum*, *Cephalanthera* und *Epipactis*. – Jour. Europ. Orch. 32 (1): 69-89; ohne Erscheinungsort.
- VÖTH WALTER 2000: *Gymnadenia*, *Nigritella* und ihre Bestäuber. – Jour. Europ. Orch. 32 (3/4): 547-573; Stuttgart.
- VOLK HELMUT 2000: Die Rheinauwälder bei Karlsruhe vor und nach der Rheinkorrektion. Ergebnisse landschaftsgeschichtlich-ökologischer Untersuchungen in der Nördlichen Oberrheinaue. – Mitt. Ver. forstl. Standortsk. Forstpflanzenzücht. 40: 35-61; Stuttgart.
- WEBER HEINRICH E. 2000: Zur Taxonomie und Verbreitung von *Rubus leucophaeus* P.J. Müller. – Ber. Bayer. Botan. Ges. 69/70: 121-126; München. [Nachweise in Baden-Württemberg bei Attenstein und Walddorf.]
- WEHRMAKER ALFRED 2000: Über das Hornköpfchen (*Ceratocephala*) in Mitteleuropa: sein Aussterben in Wien und seine Einbürgerung und Gefährdung in Stuttgart. – Linzer biolog. Beiträge 32/2: 725; Linz.
- WEHRMAKER ALFRED 2000: Bemerkungen zum Auftreten von *Impatiens capensis* Meerburgh in Mitteleuropa, insbesondere in Hessen. – Schriftenr. Umweltamt Stadt Darmstadt 16 (3): 19-25; Darmstadt.
- WEICHERDING FRANZ JOSEF 2000: Die Leinkraut-Hybride *Linaria x sepium* Allman (Scrophulariaceae) im saarländischen Kartiergebiet. – Abhandl. Delattinia 26: 149-158; Saarbrücken.
- WEICHERDING FRANZ JOSEF 2000: Wiederfunde des Nelkengewächses *Spergularia salina* (Caryophyllaceae) J. Presl & C. Presl im Saarland. – Abhandl. Delattinia 26: 159-166; Saarbrücken.
- WERNER JEAN 2000: Eine Teilkartierung in der südlichen Eifel (3. Beitrag zur Moosflora der Eifel). – Abhandl. Delattinia 26: 267-280; Saarbrücken.
- WILLING ECKHARD. 2000: Literatur-Dienst „Europäische Orchideen“ 2000/1. – Jour. Europ. Orch. 32 (1): 135-155; ohne Erscheinungsort.
- WILLING ECKHARD. 2000: Literatur-Dienst „Europäische Orchideen“ 2000/2. – Jour. Europ. Orch. 32 (3/4): 643-668; Stuttgart.
- WILMANNS OTTI 2000 [1999]: Lebensweisen der Pflanzen der Rebflur - Befunde und Gedanken zu Strategie und Ephemorie. – Carolea 57: 9-18; Karlsruhe. [Mit syntaxonomischer Gliederung des Rebunterwuchses im südlichen Oberrheingebiet.]
- WINTERHOFF WULFARD 2000: Grosspilze in Sandrasen der nördlichen Oberrheinebene. – Ber. Naturwissenschaftl. Ges. Bayreuth XXIV: 322-223; Bayreuth.
- WIRTH VOLKMAR 2000: Flechten und flechtenbewohnende Pilze neu für Deutschland. – Jahresh. Ges. Naturk. Württemberg 156: 189-191; Stuttgart.
- WISSEMANN VOLKER, HENKER HEINZ, SCHULZE GERHARD & REICHERT HANS 2000: *Rosa brilonensis* G.H. Loos, ein neues Synonym zu *Rosa corymbifera* Borkh.; charakterisiert durch molekulare und morphologische Untersuchungen. – Acta Rhodologica

II/1999: 55-63; Velburg. [Die von G.H. Loos 1998 neu beschriebene „*Rosa brilonensis*“ wird von den Autoren als auf beiden Blattseiten behaarte *Rosa corymbifera* angesehen. Derartige Formen wurden u. a. im südwestlichen Hunsrück nachgewiesen und sind vermutlich auch in Südwestdeutschland weiter verbreitet.]

WITTIG RÜDIGER 2000: Das Luzulo luzuloides-Thelypteridetum limbospermae, eine azidokline Saumgesellschaft der höheren Mittelgebirge. – Tuexenia 20: 131-141; Göttingen. [Die Untersuchung wurde u.a. im Schwarzwald durchgeführt.]

WÖRZ ARNO 2000: Floristische Neu- und Wiederfunde aus Baden-Württemberg. – Jahresh. Ges. Naturk. Württemberg 156: 223-231; Stuttgart.

ZENNER GÜNTHER & SCHMITT LARS 2000: Zwei bemerkenswerte Bärlappvorkommen in der Umgebung von Otzenhausen und Deuselbach. – Dendrocos 27 (2): 245-248a, 248b; Trier.

Nachträge 1999:

DEIL ULRICH, BOGENRIEDER ARNO & BERGMIEIER ERWIN 1999: Im Zwergengarten der Geobotanik. Ökologische und populationsbiologische Forschungen zu Isoeto-Nanojuncetea- und Isoeto-Litorelletea-Arten und -Gesellschaften. – Mitt. bad. Landesver. Naturk. Natursch. N.F. 17(2): 219-507; Freiburg i. Br.

FRAHM JAN-PETER & QUANDT DIETMAR 1999: Molekularsystematische Untersuchungen zur Klärung der Frage von Xerotherm- und Glazialrelikten in der Moosflora Europas. – Bryol. Rundbriefe 29: 1-9; Bonn. [Die Populationen von *Bartramia stricta* im Mittelmeergebiet und im Moseltal sind nach Isoenzymanalysen nicht schon seit 7000 Jahren getrennt.]

FRAHM JAN-PETER 1999: Mysteriöses Moos im Schwarzwald. – Bryol. Rundbriefe 29: 13-14; Bonn.

HANEWINKEL M. (Hrsg.) 1999: Überführung von Altersklassenwäldern in Dauerwälder. Beiträge zu einer Fachtagung der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg am 3. und 4. Dezember 1998. – Ber. Freiburger Forstl. Forsch. 8: 219 S.; Freiburg i. Br.

HILLENHAGEN UDO 1999: Einheimische Heilpflanzen. – Heimat-Landkreis Südliche Weinstrasse Jahrbuch 1999: 28-33; Otterbach/Kaiserslautern.

SARTORIS ALMA & CAPAUL URS 1999: Strassenbegleitflora an ausgewählten Standorten in Schaffhausen. – Mitt. Naturforschenden Ges. Schaffhausen 44: 233-253; Schaffhausen.

SCHÄFFER J., HOCH R., WILPERT K. VON (Red.) 1999: Stoffhaushalt von Waldökosystemen. Gemeinsames Kolloquium des Arbeitskreises „Waldböden“ der DGB und der Sektion Wald und Wasser im Deutschen Verband Forstlicher Versuchs- und

Forschungsanstalten in Freiburg vom 19. bis 20. April 1999. – Ber. Freiburger Forstl. Forsch. 7: 182 S.; Freiburg i. Br.